RESUMO

EMPREGO DE MALTE E EXTRATO DE MALTE DE TRIGO NA ELABORAÇÃO DE PÃO DE FORMA

AUTOR PRINCIPAL:

Giulia Caregnatto

E-MAIL:

giulia.caregnatto@hotmail.com

TRABALHO VINCULADO À BOLSA DE IC::

Pibic UPF ou outras IES

CO-AUTORES:

Carla Noello, Taís Gottmannshausen, Valéria Hartmann

ORIENTADOR:

Luiz Carlos Gutkoski

ÁREA:

Ciências Agrárias

ÁREA DO CONHECIMENTO DO CNPQ:

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal

UNIVERSIDADE:

Universidade de Passo Fundo

INTRODUÇÃO:

A produção de malte é um processo biotecnológico que envolve várias reações bioquímicas e fisiológicas, sendo a formação de enzimas o principal objetivo desse processo (HOUGH, 1990). O extrato de malte é resultado da desidratação total ou parcial do mosto de malte até o estado sólido ou pastoso, devendo apresentar propriedades similares quando reconstituído, podendo manter a atividade diastásica. A adição de malte e extrato de malte de trigo na elaboração de produtos de panificação ainda é pouco utilizada, mas acredita-se que as vantagens observadas em pães são possíveis de serem conseguidas neste tipo de produto. Devido à ampliação da demanda por alimentos naturais, pesquisas são realizadas para novos métodos de obtenção de produtos de panificação com melhoria de maciez, textura e vida de prateleira dos pães. O trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a aplicação de malte e extrato de malte em pão de Forma, visando a melhoria de características funcionais e sensoriais.

METODOLOGIA:

O trabalho foi realizado com emprego de malte de trigo, seco na temperatura de 60 °C e de extrato de malte de trigo, seco na temperatura de 110 °C, produzidos no laboratório de Cereais do Cepa/UPF. Os pães de Forma foram formulados com uso de ingredientes farinha de trigo, gordura, ácido ascórbico, ovos, sal, água e fermento biológico. O malte e o extrato de malte foram adicionados nas concentrações 0; 0,6; 2,0; 3,4 e 4% e 0; 1,0; 3,5; 6,0 e 7%, respectivamente e realizado onze diferentes formulações de pães de Forma. Os pães foram avaliados quanto a textura em aparelho texturômetro TAXT2i, cor da crosta e miolo determinada em espectrofotômetro Hunter Lab, modelo Color Quest II, volume específico, determinado pelo método de deslocamento de sementes de painço e o escore de pontos sendo determinada pelo método EI-Dash (1978). A significância dos dados foi testada pela análise de variância (Anova) e nos modelos significativos as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

As formulações de pão de Forma apresentaram diferenças significativas quanto ao volume específico. O volume específico dos pães reduziu com elevadas concentrações de malte e extrato de malte de trigo. O aumento no volume dos pães pode estar relacionado à maior quantidade de açúcares fermentescíveis. (HOPEK et al., 2006). A firmeza variou significativamente entre as formulações estudadas, se apresentando mais adequadas para a mastigação os tratamentos com 7 e 8 (Tabela 1) por serem significativamente inferiores, os quais possuem 2% de malte, variando de 0 a 7% de extrato de malte, respectivamente. A alta concentração de extrato de malte pode explicar o aumento da maciez do pão, devido ao alto teor de açúcares presente no mesmo. Na Tabela 1 estão apresentados os valores de escore de pontos, onde variam entre 65 e 89, sendo maior nos experimentos com concentrações intermediárias de malte. O pão que apresentou o melhor valor de escore de pontos foi o experimento 4, elaborada com 3,4% de malte e 6% de extrato de malte, não diferindo significativamente ($p < 0,05$) dos experimentos 3, 5, 8 e 9, sendo estas as formulações que possuem maior concentração de malte de trigo e uma quantidade intermediária de extrato de malte. Os valores de coordenada de cromaticidade L^* , a^* e b^* variaram significativamente entre as formulações de pães estudadas. A formulação que apresentou valores de L^* mais claros para miolo e crosta foi o tratamento com a menor concentração de malte e extrato de malte. A menor intensidade de a^* (vermelho) para cor da crosta ficou abaixo de zero, variando mais para o verde, ou seja, não apresentaram coloração avermelhada. Já para a cor do miolo foi o tratamento 4, elaborada com 3,4 % de malte e 6,0 % de extrato de malte. Os maiores valores de b^* (intensidade de amarelo) tanto para cor do miolo quanto crosta foi o tratamento 4, que foi elaborado com alta concentração de malte e de extrato de malte de trigo (Tabela 2).

CONCLUSÃO:

A aplicação de malte e extrato em pães melhorou as características tecnológicas, sendo mais significativo no tratamento com emprego de concentração intermediária de malte e alta concentração de extrato de malte. O malte e o extrato de malte de trigo podem ser empregados em pão de Forma visando a melhoria de características funcionais e sensoriais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- HOUGH, J.S. Biotecnología de la cerveza y de la malta. Zaragoza: Acribia, 1990.
- EL-DASH, A. A. Standardized mixing and fermentation procedure for experimental baking test. Cereal Chemistry, Saint Paul, v.55, n. 4, p. 436-446, 1978.
- HOPEK, M.; ZIOBRO, R.; ACHREMOWICZ, B. Comparison of the effects of microbial α -amylases and scalded flour on bread quality. Acta Scientiarum Polonorum, v. 5, n. 1, p. 97-106, 2006.

Tabela 1. Volume específico, escore de pontos e firmeza de pães de fôrma elaborados com diferentes concentrações de malte e extrato de malte de trigo.

Experimento	Volume Específico (cm ³ /g)	Firmeza (g)	Escore de Pontos
1	5,29 ^b	171,50 ^{cd}	65,44 ^e
2	4,81 ^c	245,30 ^a	77,81 ^{bcd}
3	4,74 ^c	189,18 ^{bc}	79,49 ^{abc}
4	4,28 ^d	212,62 ^{ab}	89,37 ^a
5	5,87 ^a	133,03 ^{de}	71,83 ^{cde}
6	4,75 ^c	139,12 ^{de}	86,69 ^{ab}
7	5,37 ^b	109,41 ^e	66,63 ^{de}
8	5,37 ^b	109,85 ^e	80,63 ^{abc}
9	4,63 ^c	160,76 ^{cd}	87,70 ^{ab}

Letras diferentes em uma mesma coluna correspondem à diferença significativa pelo Teste de Tukey com o $p < 0,05$. Os valores das médias são relativos aos experimentais das análises realizadas em triplicata

Tabela 2. Coordenada de cromaticidade L*, coordenada de cromaticidade +a* (vermelho) e coordenada de cromaticidade +b* (amarelo) de cor da crosta e miolo dos pães de fôrma obtidos em diferentes concentrações de malte e extrato de malte de trigo.

Experimentos	crosta			miolo		
	L	a*	b*	L	a*	b*
1	70,72 ^b	-6,81 ^a	32,54 ⁱ	84,31 ^c	0,03 ⁱ	16,96 ^h
2	69,63 ^c	-7,09 ^c	33,32 ^f	77,17 ^g	0,42 ^g	19,17 ^e
3	70,74 ^a	-7,03 ^b	33,76 ^e	79,31 ^f	0,83 ^c	20,18 ^c
4	64,93 ^h	-9,52 ^h	35,89 ^a	75,5 ^h	1,33 ^a	22,36 ^a
5	64,22 ⁱ	-9,83 ⁱ	34,91 ^c	81,81 ^e	0,5 ^f	20,29 ^b
6	66,37 ^g	-8,96 ^g	33,00 ^g	71,44 ⁱ	1,27 ^b	19,11 ^f
7	68,24 ^f	-8,32 ^f	35,27 ^b	86,9 ^a	0,27 ^h	16,22 ⁱ
8	68,78 ^d	-7,48 ^d	32,57 ^h	81,97 ^d	0,78 ^d	19,63 ^d
9	68,26 ^e	-8,27 ^e	34,28 ^d	86,06 ^b	0,53 ^e	18,57 ^g

Letras que se diferenciam na horizontal indicam diferenças significativas entre as médias pelo teste de Tukey a 5%. Os valores das médias são relativos de análises realizadas em triplicata.

Assinatura do aluno

Assinatura do orientador