



**XXIV**  
**Mostra**  
**de Iniciação**  
**Científica**

**SEMANA DO**  
**CONHECIMENTO**

A Universidade em movimento

De **7a10** de outubro de 2014



## **RELATO DE CASO**

### **NOVAS EVIDÊNCIAS SOBRE INDICAÇÃO DE FRENECTOMIA LINGUAL**

**AUTOR PRINCIPAL:**

Bruna Wagner Fior

**E-MAIL:**

bruh\_bubi@hotmail.com

**TRABALHO VINCULADO À BOLSA DE IC::**

Não

**CO-AUTORES:**

Moisés Zacarias Cardoso, Suelen Munz, Bruna Signor, Bruna ELiza Mazzonetto, Camila Rodrigues do Amarante, Juliane Bervian

**ORIENTADOR:**

Juliane Bervian

**ÁREA:**

Ciências Biológicas e da Saúde

**ÁREA DO CONHECIMENTO DO CNPQ:**

Biológicas

**UNIVERSIDADE:**

Universidade de Passo Fundo

**INTRODUÇÃO:**

O objetivo deste trabalho é relatar dois casos clínicos, comparando e enfatizando a atual tendência na indicação de frenectomia lingual com a aplicação de um protocolo para bebês.

**RELATO DO CASO:**

Descrição dos casos: Caso 1: bebê de 10 dias (JPG) com dificuldade na amamentação, mãe com fissura no bico do peito e criança sem ganho de peso. Avaliação fonoaudiológica da função de sucção e avaliação de frênulo segundo Martinelli 2012 com pontuação equivalente a indicação cirúrgica. Caso 2: criança de 5 anos (LM), com alteração de fala e deglutição. Avaliação de frênulo segundo Marchesan (2003), e indicação cirúrgica. O primeiro caso foi submetido à frenectomia simples em ambiente de consultório, porém, para o segundo, a cirurgia teve que ser realizada em bloco cirúrgico.

**CONCLUSÃO:**

A língua é um órgão especializado localizado na cavidade oral, participando ativamente das funções de sucção, deglutição, mastigação e fala. Devido a esses fatores, sua remoção cirúrgica é indicada precocemente, para que assim ocorra o adequado desenvolvimento das funções bucais, além de uma melhor qualidade de vida para o indivíduo.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

Marchesan, I.Q.; Teixeira, A. N.; Cattoninai, D.M. Correlações entre diferentes frênulos linguais e alterações na fala. Rev Distúrb Com, v. 22, n.3, p. 195-200, 2010. Melo, N.S.F.O.; Lima, A.A.S.; Fernandes, A.; Silva, R.P.G.V.C. Anquiloglossia: Relato de caso. Rev RSBO, v. 8, n.1, p. 102-107, 2011.

## NOVAS EVIDÊNCIAS SOBRE INDICAÇÃO DE FRENECTOMIA LINGUAL

Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar dois casos clínicos, comparando e enfatizando a atual tendência na indicação de frenectomia lingual com a aplicação de um protocolo para bebês. Descrição dos casos: Caso 1: bebê de 10 dias (JPG) com dificuldade na amamentação, mãe com fissura no bico do peito e criança sem ganho de peso. Avaliação fonoaudiológica da função de sucção e avaliação de frênulo segundo Martinelli 2012 com pontuação equivalente a indicação cirúrgica. Caso 2: criança de 5 anos (LM), com alteração de fala e deglutição. Avaliação de frênulo segundo Marchesan (2003), e indicação cirúrgica. O primeiro caso foi submetido à frenectomia simples em ambiente de consultório, porém, para o segundo, a cirurgia teve que ser realizada em bloco cirúrgico. Considerações finais: A língua é um órgão especializado localizado na cavidade oral, participando ativamente das funções de sucção, deglutição, mastigação e fala. Esses distúrbios bucais podem ser alterações transitórias do funcionamento bucal ou características individuais anatômicas. As disfunções bucais, quando presentes, levam a pouco ganho de peso ou ao desmame precoce. Devido a esses fatores, sua remoção cirúrgica é indicada precocemente, para que assim ocorra o adequado desenvolvimento das funções bucais, além de uma melhor qualidade de vida para o indivíduo.

## Referências Bibliográficas

Marchesan, I.Q.; Teixeira, A. N.; Cattoninais, D.M. Correlações entre diferentes frênulos linguais e alterações na fala. Rev Distúrb Com, v. 22, n.3, p. 195-200, 2010.

Melo, N.S.F.O.; Lima, A.A.S.; Femandes, A.; Silva, R.P.G.V.C. Anquiloglossia: Relato de caso. Rev RSBO, v. 8, n.1, p. 102-107, 2011.

---

Assinatura do aluno

---

Assinatura do orientador