



**XXIV**  
**Mostra**  
**de Iniciação**  
**Científica**

**SEMANA DO**  
**CONHECIMENTO**

A Universidade em movimento

De **7 a 10** de outubro de 2014



## RESUMO

### **COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIA NÃO PRECEDIDA DE DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL EM PACIENTE DE 23 ANOS**

**AUTOR PRINCIPAL:**

Luiza Alves Nabarros

**E-MAIL:**

luizanabarros@gmail.com

**TRABALHO VINCULADO À BOLSA DE IC::**

Não

**CO-AUTORES:**

Luiz Filipe Machado Garcia; Laís Antunes de Lima; Leonardo Lucena; Lucas Dalbosco; Marcelo Dall'Agno; Daniel Navarini; Luciana Schraiber.

**ORIENTADOR:**

Luciana Schraiber

**ÁREA:**

Ciências Biológicas e da Saúde

**ÁREA DO CONHECIMENTO DO CNPQ:**

4.01.00.00-6 Medicina

**UNIVERSIDADE:**

Universidade de Passo Fundo

**INTRODUÇÃO:**

A Colangite Esclerosante Primária (CEP) é caracterizada por um processo inflamatório crônico, esclerosante e obliterativo que afeta os ductos biliares intra e/ou extra-hepáticos, ocorrendo principalmente na terceira a quinta décadas de vida. Os sinais e sintomas de CEP incluem os de obstrução biliar crônica ou intermitente. O diagnóstico precoce é de extrema importância, pois quadros mais avançados podem evoluir para cirrose biliar, sendo que 7% dos indivíduos com CEP desenvolvem colangiocarcinoma. Devido ao grau de importância desta patologia no meio médico e à gravidade de suas implicações à vida do paciente, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente jovem, portador de CEP e pâncreas divisum, atendido no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo (RS).

**METODOLOGIA:**

Foi realizado relato de caso de paciente portador de colangite esclerosante primária e internado no Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo - RS. O relato foi feito com base no acesso ao prontuário médico do paciente, exames laboratoriais e de imagem.

**RESULTADOS E DISCUSSÕES:**

Estudos demonstram que há uma leve predominância de CEP no sexo masculino (2:1), o que foi observado no presente estudo. Além disso, a sintomatologia descrita na literatura também é compatível com quadro de apresentado. No entanto, há dois fatos intrigantes: a faixa etária acometida e a ausência de doença inflamatória intestinal. Além disso, a literatura demonstra que pacientes que recebem o diagnóstico de CEP sem a presença de doença inflamatória intestinal geralmente são mulheres e recebem o diagnóstico após a quinta década de vida.

**CONCLUSÃO:**

O quadro apresentado de CEP pode ser considerado como atípico no que diz respeito à faixa etária acometida e à ausência de doença inflamatória intestinal.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

LONGO, Dan L.; HARRISON, Tinsley Randolph (Coord). Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw Hill, 2012

KUMAR, Vinay. Robbins e Conran: Patologia: Bases Patológicas das Doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010

KRONES, Elisabeth; GRAZIADEI, Ivo; TRAUNER, Michael; FICKERT, Peter. Evolving Concepts in Primary Sclerosing Cholangitis. Liver International, v. 32, p. 352-369, 2012.

---

Assinatura do aluno

---

Assinatura do orientador