



Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo:

Resumo

Relato de Caso

O Zulliger na avaliação de adultos mais velhos em tratamento hemodialítico

AUTOR PRINCIPAL: Louise Zart

CO-AUTORES: Cláudia Daiane Trentin Lampert

ORIENTADOR: Silvana Alba Scortegagna

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo

INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) consiste na falência dos rins, geralmente irreversível, e implica na necessidade de tratamento hemodialítico. A enfermidade acomete especialmente adultos idosos, hipertensos, com diabetes e doença cardiovascular. Entre as razões, as comorbidades impulsionam a realização de avaliações psicológicas frequentes e são praticamente inexistentes com métodos de autoexpressão. Considerando o exposto, este estudo objetivou avaliar as características psicológicas de adultos mais velhos em hemodiálise com o uso do teste de Zulliger.

DESENVOLVIMENTO:

Participaram oito homens, com 65 anos e mais idade, em tratamento de hemodiálise, em um hospital no interior do estado do Rio Grande do Sul. Como instrumentos foram utilizados o teste de Zulliger no sistema compreensivo (ZSC) e a Escala de Depressão Geriátrica (GDS). O estudo foi autorizado pelo hospital e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UPF). Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam aos instrumentos individualmente, durante a hemodiálise. Os dados foram analisados por meio de frequência e percentual. Os resultados do ZSC evidenciaram: a) um estilo introversivo de vivência ($M > WSumC$), caracterizando a preferência em usar a ideiação ou deliberação racional para resolver problemas; b) baixo controle em situações estressantes, e dificuldades na tomada adequada de decisões ($EA < es$); c) a presença de afetos que estão sendo internalizados ao invés de serem expressos, sentimentos dolorosos e desagradáveis ($\uparrow SumC'$); d) tendência a interpretar inadequadamente as ações e intenções dos outros ($\uparrow X\%$); e) percepções negativas e distorcidas dos relacionamentos interpessoais ($GHR < PHR$). Os resultados do GDS não indicaram depressão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante dos resultados obtidos, verifica-se a necessidade de se realizar intervenções de caráter interdisciplinar, a fim de que estes pacientes possam ser melhor assistidos em relação às dificuldades cognitivas, afetivas, de relacionamento interpessoal, no sentido de potencializar seus recursos para o melhor enfrentamento da doença.

REFERÊNCIAS

VIEIRA, C; FAY, S. M. E; NEIVA-SILVA, L. Avaliação psicológica, neuropsicológica e recursos em neuroimagem: novas perspectivas em saúde mental. *Aletheia*, n. 26, p. 181-195, 2007.

LAZARETTI, C. Insuficiência renal crônica: da diálise ao transplante renal, uma reconstrução subjetiva. In: SCORTEGAGNA, S. A.; BENINCÁ, C. R. (Org.). *Interfaces da Psicologia com a saúde*. Passo Fundo: UPF, 2004. p.140-174.

VILLEMOR-AMARAL, A. E.; CARDOSO, L. M. Validade Convergente do Tipo de Vivência (EB) no Teste de Zulliger/SC. *Psico*, Porto Alegre, v. 43, n.01, p. 109-115, 2012.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 169.507