

IV SEMANA DO CONHECIMENTO

COMPARTILHANDO E FORTALECENDO REDES DE SABERES

6 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017



Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo:

() Resumo

(X) Relato de Caso

PÓLIPO BENIGNO COMO ETIOLOGIA DE INTUSSUSCEPÇÃO .

AUTOR PRINCIPAL: Tiago Azambuja.

CO-AUTORES: Fernanda Prado, Fernanda Tissot Burtet, Gabriela Spessato, Gabriel Costa, Maiara Christine Macagnan, Miguel Duda Schmitz e Pedro Moreno Fonseca.

ORIENTADOR: Rubens Rodriguez.

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.

INTRODUÇÃO:

Intussuscepção intestinal é uma causa rara de obstrução em adultos, tanto quanto uma patologia benigna causar intussuscepção nessa faixa etária. Relatamos o caso de uma paciente adulta que apresentou sintomatologia típica de intussuscepção e, como fator etiológico, um pólipio inflamatório em sítio incomum. Por isso, o objetivo do relato é compreender melhor a dinâmica da ocorrência da intussuscepção por etiologia benigna. As informações presentes neste trabalho foram obtidas por meio de revisão de prontuário, análise de exames anatomopatológicos, imuno-histoquímicos e revisão de literatura, contando com autorização prévia da paciente.

DESENVOLVIMENTO:

A intussuscepção é uma causa rara de obstrução intestinal no adulto [1]. Os exames de imagem evidenciam a obstrução e, mais especificamente, revelam o sinal do alvo e o sinal do pseudo-rim (no USG abdominal), característicos da telescopagem intestinal. O diagnóstico é confirmado cirurgicamente e o tratamento também é cirúrgico. A ressecção cirúrgica, com suspeita de malignidade, foi enviada para estudo histopatológico com resultado de pólipio fibróide inflamatório. É uma lesão benigna, tendo a menor incidência entre as lesões benignas (1 – 4%). Há chance mínima de malignidade, tendo predomínio epidemiológico na sexta década de vida entre indivíduos do sexo masculino. A sintomatologia é inespecífica, podendo cursar com náuseas, dor abdominal, vômitos, hemorragia digestiva, perda de peso. Raramente evolui para um quadro de obstrução intestinal, sendo a intussuscepção, no adulto, um evento ímpar. O pólipio tem morfologia característica; é um nódulo circunscrito, com proliferação submucosa de células fusiformes e células mesenquimais estreladas. Origina-se na submucosa ou nas porções profundas da mucosa sendo constituídos por

IV SEMANA DO CONHECIMENTO

COMPARTILHANDO E FORTALECENDO REDES DE SABERES

6 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017



células fusiformes que se dispõem em torno de vasos com padrão em “bulbo de cebola[2].

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A análise do caso permite inferir que a intussuscepção, em adultos, não se manifesta tipicamente como obstrução intestinal. O quadro clínico possui particularidades que merecem atenção. A sucessão de intussuscepção, em paciente adulto e tendo como etiologia o pólipio fibroide inflamatório, torna esse caso incomum. Métodos diagnósticos, como a ultrassonografia, mostram-se simples em contraste à complexidade do caso.

REFERÊNCIAS:

1. ERKAN, N. et al. Intussusception in adults: an unusual and challenging condition for surgeons. Int J Colorectal Dis 2005; 20:452.
2. MARINIS, A. et al. Intussusception of the bowel in adults: a review. World J Gastroenterol.. Athens, p. 407-411. 28 jan. 2009. (A et al., 2009)

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da aprovação.

ANEXOS:

Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se necessário.